

Ficha Técnica Baraticida Atual- TOPGEL MATA BARATA



Nome Comercial: Atual TOPGEL MATA BARATA

Nome Comum: Imidacloprido Categoria: Gel BARATICIDA

Registro Ministério da Saúde: 366180003

Composição:

IMIDACLOPRIDO0,1 % F	γ/P
BENZOATO DENATONIO0,01% F	P/P
INERTES (Atrativo, diluente e veiculo)q.s.p 99,89% F	P/P

Disponível em:

Em cartelas de 10 unidades de 10g

Apresentação

INDICAÇÕES DE USO: TOP GEL é um produto pronto uso, elaborado com imidacloprido, eficaz no controle de Baratas.

Modo de Usar

Retire a tampa protetora da seringa. Encoste o bico do aplicador no local da aplicação. Pressione lentamente o êmbolo para formar uma pequena gota do tamanho da cabeça de um pálito de fósforo. Aplique de 2 a 3 gotas por m² ou a cada 50 cm umas das outras, próximas aos esconderijos das Baratas, tais como: embaixo de pias, mesas, balcões, atrás e debaixo de fogões, geladeiras, armários, balanças eletrônicas, fendas, frestas, batente de portas e janelas, rodapés, envolta de ralos e lixeiras, etc. Reaplicar **TOPGEL MATA BARATAS** nos pontos onde o produto foi consumido. Repita a aplicação a cada 30 dias para evitar novas infestações.



R.A. DIAS ROSSI E CIA LTDA ME AV. Getulio Vargas, 960 CAJURU - SP Fone (16) 3667-2065 CNPJ.: 15.279.856/0001-15

atual@atualinseticidas.com.br

Precauções

- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OUABSORÇÃO PELA PELE
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Utilizar luvas durante a aplicação
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Só utilizar em lugar de dificil acesso a crianças e animais domésticos.
- Não misture ou aplique o produto com alimentos e animais domésticos.
- Não utilizar as embalagens vazias.

Armazenamento:

Conservar o produto na embalagem original em local seco, ventilado, coberto e a temperatura ambiente.

Eliminação e Descarte:

- A isca residual poderá ser removida com uso de detergente e descartada em lixeira doméstica, assim como as embalagens vazias.
- Recomenda-se que o usuário utilize luvas, durante a manipulação e uso do produto.

Primeiros Socorros:

Em caso de intoxicação, procurar o centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

Instruções de Uso Médico

Grupo Químico: Neonicotinoide Nome Técnico: Imidacloprido

Antidoto e Tratamento: Não há tratamento específico Em caso de Intoxicação procure imediatamente um médico, levando a embalagem do Produto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA
CLASSE - GEL BARATICIDA - PRONTO PARA USO
Resp. Técnico: Edivaldo Cipriano da Silva - CRQ-IV 04210048

www.atualinseticidas.com.br